


EXERCICE 1 (5 points)

Commun à tous les candidats

Pour chacune des questions, une seule des réponses A, B ou C est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Barème : une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fautive enlève 0,25 point, l'absence de réponse ne rapporte aucun point et n'en enlève aucun. Si le total des points est négatif, la note globale attribuée à l'exercice est 0.

La courbe \mathcal{C} ci-dessous est une partie de la courbe représentative, dans un repère orthogonal, d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $I = [-4; 4]$. La droite T tangente à la courbe \mathcal{C} au point $A(0; 1,5)$ passe par le point $B(3; 0)$. On note f' la fonction dérivée de f .



1. $f'(0)$ est égal à :

RÉPONSE A : 1,5

RÉPONSE B : -0,5

RÉPONSE C : 0,5

2. $f'(x) \leq 0$ si x appartient à l'intervalle :

RÉPONSE A : $[-4; -1]$

RÉPONSE B : $[1; 3]$

RÉPONSE C : $[0; 1]$

3. $\int_{-2}^0 f(x) dx$ est un nombre de l'intervalle :

RÉPONSE A : $[0; 2]$

RÉPONSE B : $[2; 4]$

RÉPONSE C : $[4; 6]$

4. L'équation $\ln[f(x)] = 0$ a exactement :

RÉPONSE A : 1 solution

RÉPONSE B : 2 solutions

RÉPONSE C : 3 solutions

5. Soit la fonction g définie sur l'intervalle $[-4; 1[$ par $g(x) = \frac{1}{f(x)}$. La fonction g est croissante sur l'intervalle :

RÉPONSE A : $[-3; -1]$

RÉPONSE B : $[-2; 1[$

RÉPONSE C : $[0; 1[$

EXERCICE 2 (5 points) *Candidats de la série ES n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité*

Le tableau ci-dessous donne en euros le montant des remboursements annuels y_i effectués de 2003 à 2007 par un ménage, à la suite de divers emprunts :

Année	2003	2004	2005	2006	2007
Rang x_i de l'année	1	2	3	4	5
y_i	6096	7602	9170	11155	15385

1. Construire le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$, avec i compris entre 1 et 5, associée à cette série statistique. On prendra comme unité graphique 2 cm pour 1 en abscisse et 1 cm pour 1000 euros en ordonnée. On commencera les graduations au point de coordonnées (0;6000).
2. On pose, pour i variant de 1 à 5, $z_i = \ln y_i$.
 - a) Calculer z_i en arrondissant les valeurs à 10^{-3} près.
 - b) Déterminer, à l'aide de la calculatrice, une équation de la droite d'ajustement de z en x , obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients obtenus à l'aide de la calculatrice seront arrondis au centième.
 - c) En déduire que l'on peut écrire une relation entre y et x sous la forme : $y = Ae^{Bx}$ avec $A \approx 4817$ et $B \approx 0,22$.
 - d) En supposant, que cet ajustement reste valable en 2008, estimer le montant des remboursements annuels de ce ménage en 2008, arrondi à l'euro.
3. *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

Ce ménage disposait de 50 000 euros de revenu annuel en 2006. On estime que son revenu annuel augmente de 2 % par an.

La banque alerte ses clients lorsque le montant des remboursements des emprunts dépasse le tiers du montant des revenus.

En quelle année la banque alertera-t-elle ce ménage? Justifier.

EXERCICE 3 (5 points)

Commun à tous les candidats

Un club de natation propose à ses adhérents trois types d'activité : la compétition, le loisir ou l'aquagym. Chaque adhérent ne peut pratiquer qu'une seule des trois activités.

30 % des adhérents au club pratiquent la natation en loisir, 20 % des adhérents au club pratiquent l'aquagym et le reste des adhérents pratiquent la natation en compétition.

Cette année, le club propose une journée de rencontre entre tous ses adhérents. 20 % des adhérents de la section loisir et un quart des adhérents de la section aquagym participent à cette rencontre. 30 % des adhérents de la section compétition ne participent pas à cette rencontre.

On interroge au hasard une personne adhérente à ce club. On considère les événements suivants :

A « La personne interrogée pratique l'aquagym »,

C « La personne interrogée pratique la natation en compétition »,

L « La personne interrogée pratique la natation en loisir »,

R « La personne interrogée participe à la rencontre » et \bar{R} son événement contraire.

- Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
- Calculer la probabilité que la personne interrogée pratique la natation en compétition et qu'elle participe à la rencontre.
 - Le président du club déplore que plus de la moitié des adhérents ne participent pas à la rencontre. Justifier son affirmation par un calcul.
- On interroge une personne au hasard lors de la rencontre. Calculer la probabilité qu'elle soit dans la section compétition. *Donner une valeur approchée du résultat arrondie à 10^{-2} près.*
- Les tarifs du club pour l'année sont les suivants : l'adhésion à la section compétition est de 100 € et l'adhésion à la section loisir ou à l'aquagym est de 60 €. De plus, une somme de 15 € est demandée aux adhérents qui participent à la rencontre.

On appelle S la somme annuelle payée par un adhérent de ce club (adhésion et participation éventuelle à la rencontre).

- Recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de S :

S_i	60	75	100	115
p_i		0,11		0,35

- Calculer l'espérance mathématique de S et interpréter ce nombre.

EXERCICE 4 (5 points)

Commun à tous les candidats

I . Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = 0,5x + e^{-0,5x+0,4}$.

1. Calculer $f'(x)$ où f' désigne la fonction dérivée de f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
2. Étudier les variations de f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ et vérifier que f admet un minimum en 0,8.

II . Application économique

Une entreprise fabrique des objets. $f(x)$ est le coût total de fabrication, en milliers d'euros, de x centaines d'objets. Chaque objet fabriqué est vendu 6 €.

1. Quel nombre d'objets faut-il produire pour que le coût total de fabrication soit minimum?
2. Le résultat (recette moins coûts), en milliers d'euros, obtenu par la vente de x centaines d'objet est :
 $R(x) = 0,1x - e^{-0,5x+0,4}$.
 - a) Étudier les variations de R sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
 - b) Montrer que l'équation $R(x) = 0$ a une unique solution α dans l'intervalle $[0 ; +\infty[$. Déterminer un encadrement de α à 10^{-2} près.
 - c) En déduire la quantité minimale d'objets à produire afin que cette entreprise réalise un bénéfice sur la vente des objets.